

CHIEN DES BUISSONS

(Speothos venaticus)



Origine: Amérique central et Amérique du Sud

Longueur: Varie de 60 cm à 65 cm

Queue: environ 20 cm

Poids: Entre 5 kg et 7 kg

Espérance de vie: 10 ans

Fiche Découverte

Le Chien Des buissons appelé Bush Dog en Anglais est un petit canidé. C'est à dire qu'il fait partie de la même famille que le chien ou le loup. C'est un animal très rare dans la nature. Il fut découvert pour la première fois en 1842 à partir d'ossements mais l'animal fut découvert vivant plus tard.

Il est aujourd'hui classé comme animal bénéficiant d'une protection totale. L'espèce regroupe 3 sous espèces

- *Speothos venaticus panamensis*
- *Speothos venaticus venaticus*
- *Speothos venaticus wingei*

Qui sont classés par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) comme quasi-menacés.




Morphologie

Le Chien Des Buissons est un petit canidé trapu avec une tête massive surmonter de deux petite oreilles.

Les pattes sont courtes et les doigts de ces pattes sont reliés par une membrane qui lui permet de nager. La queue est très courte.

Le pelage est roux tirant sur le marron pour la quasi-totalité du corps sauf pour la queue qui est noire ainsi que les pattes qui sont plus foncées que le reste du corps.



Régime Alimentaire

Le Chien Des Buissons est carnivore, en effet il se nourrit de rongeur comme par exemple le cabiai, le capibara ou l'agouti, mais également d'oiseaux aquatiques, d'amphibiens et de reptiles.



Comportement

Le Chien Des Buissons comme beaucoup d'autre canidé vie en groupe hiérarchisé avec un couple dominant. Le groupe peut atteindre une dizaine d'individus.

Ils ont un mode de vie semi-aquatique. Le Chien Des Buissons est un animal diurne (*voir index du site*) qui chasse donc le jour. Pour les petites proies il chasse seul mais si les proies sont plus grandes il chasse en meute. Il ne s'éloigne que très rarement des abords des bois. Ils vivent principalement dans des terriers.

Reproduction

Il n'y a pas vraiment de période de reproduction définies. La maturité sexuelle (*voir index du site*) est atteinte à 12 mois.

La gestation (*voir index du site*) dure environ 67 jours soit deux mois au quel des termes, la femelle met au monde une portée de 4 à 6 petits qui seront alimentés par les adultes durant 5 mois.



Référence

- <http://www.iucnredlist.org/details/20468/0>
- <http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp?s=y&id=14000836>
- <http://www.waza.org/fr/zoo/galerie-de-photos/speothos-venaticus>
- <http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-chien-buissons-8439/>